

CODASTING
Referência: FT-P-039**TEORES DECLARADOS**

Azoto (N) total	8,1% p/v	7,2% p/p
Azoto (N) amoniacal	0,1% p/v	0,1% p/p
Azoto (N) orgânico	2,3% p/v	2,0% p/p
Azoto (N) ureico	5,7% p/v	5,1% p/p
Aminoácidos livres	10,1% p/v	9,0% p/p

CLASSIFICAÇÃO

OUTROS ADUBOS E PRODUTOS ESPECIAIS. AMINOÁCIDOS.

Classe A - Teor de metais pesados inferior aos limites admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Aparência	Solução escura
Cor	Castanha
Densidade	1,12 ± 0,01 kg/l
pH	5,5 ± 0,5
Solubilidade	Totalmente solúvel em água

PROPRIEDADES

O Codasting é um fertilizante especial para aplicação quer por via foliar que radicular, com grande poder de penetração e de efeito rápido na planta. A sinergia entre o azoto, os aminoácidos e os coadjuvantes especiais potencia os efeitos sobre a cultura, que entre os quais se incluem:

- Aumento da massa de raízes e crescimento vegetativo;
- Avanço da floração;
- Aumento da qualidade dos frutos (peso, cor e teor de açúcar)
- Maior resistência a condições de stress (falta de água, mudanças bruscas de temperatura, etc.).

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Codasting é um produto líquido completamente solúvel em água, recomendado em todo o tipo de cultura. O Codasting pode ser usado em aplicação foliar ou em fertirrega.

- Aplicação em fertirrega:

Dose	Nº de aplicações	Observações
1 - 2 l/ha	3 - 4 (a intervalos de 20 dias)	1ª aplicação: Início da floração 2ª aplicação: Vingamento 3ª aplicação: Desenvolvimento do fruto

- Aplicação foliar:

Cultura	Dose	Nº de aplicações	Observações
Abacate, anona	100 ml/100 l	2	1ª aplicação: Pré-floração. 2ª aplicação: Pós-floração.
Algodão, girassol	1 l/ha	2	1ª aplicação: Pré-floração. 2ª aplicação: Dentro de 20 - 30 dias.
Batata	100 ml/100 l	3	1ª aplicação: Estágio de 4 - 6 folhas. Restantes: A intervalos de 20 dias.
Beterraba	1 l/ha	1	Quando a planta tem 6 - 10 folhas
Citrinos	100 ml/100 l	2 - 3	1ª aplicação: Pré-abrolhamento de Primavera. 2ª aplicação: Queda das pétalas. 3ª aplicação: Crescimento do fruto
Ervilha, feijão	100 ml/100 l	3	1ª aplicação: Estágio de 4 - 6 folhas. Restantes: A intervalos de 20 dias
Fruteiras	100 ml/100 l	2 - 3	1ª aplicação: Queda das pétalas. Restantes: A intervalos de 15 - 20 dias.
Hortícolas	100 - 150 ml/100 l	2 - 4	1ª aplicação: Pré-floração ou estágio de 4 - 6 folhas. Restantes: A intervalos de 15-20 dias.
Morango	100 ml/100 l	3 - 4	1ª aplicação: Pré-floração. Restantes: A intervalos de 20 dias.
Nêspera	100 ml/100 l	3	1ª aplicação: Pré-floração 2ª aplicação: Pós-floração. 3ª aplicação: Perto da maturação.
Olival	75 - 100 ml/100 l	2	1ª aplicação: Início da floração. 2ª aplicação: Final da frutificação.
Vinha	75 - 100 ml/100 l	2	1ª aplicação: Pré-floração 2ª aplicação: Pós-floração

Em estufa, recomenda-se a aplicação de doses mais elevadas.

OBSERVAÇÕES

O Codasting não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, tanto de transporte como de armazenamento.

É um produto compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto de reacção alcalina.

No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

É recomendada a aplicação sob assessoria técnica agronómica.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: 5 a 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

Antes de usar, ler atentamente o rótulo.