

FIX-BLOOM
Referência: FT-00322**TEORES DECLARADOS (% p/p)**

8,6% Molibdénio (Mo) sob a forma de sal sódico, solúvel em água

CLASSIFICAÇÃO

FERTILIZANTE UE

ADUBO INORGÂNICO ELEMENTAR DE MICRONUTRIENTE [CFP 1(C)(II)(a)] líquido

Adubo de micronutrientes em solução 8,6% Mo

Classe II - Teor de metais pesados inferior aos limites admissíveis para esta classificação (Decreto-Lei N.º 103/2015, Anexo II).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Concentrado Solúvel (SC)
Estado físico	Líquido
Cor	Azul
Densidade a 20°C	1,35 ± 0,03 kg/l
pH	2,5 ± 0,5

PROPRIEDADES

O Fix-Bloom é uma formulação especial de molibdénio complexado com fosfocomplexos e coadjuvantes específicos como pteridinas e purinas, que conferem ao produto uma importante capacidade catalisadora enzimática.

O Fix-Bloom proporciona efeitos positivos e determinantes nas plantas:

- Aumenta o poder germinativo das sementes;
- Origina um maior e melhor sistema radicular;
- Antecipa a floração;
- Estimula a produção de proteínas e o teor de clorofilas;

- Aumenta a qualidade da fruta (tamanho, cor, peso);
- Protege a cultura contra adversidades climáticas.
- Facilita a assimilação normal do azoto, a síntese de ácido L-ascórbico (vitamina C) e faz com que o ferro esteja fisiologicamente activo dentro da planta.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Fix-Bloom é um corrector de carências de molibdénio concebido para ser aplicado tanto por via foliar como na fertirrega.

ARROZ

- 1 l/ha no abrolhamento.

BANANEIRAS

- Aplicar em floração e repetir o tratamento 15 - 20 dias depois, à razão de 0,5 l/ha.

CITRINOS

- Aplicar 2 - 3 tratamentos por via foliar à razão de 100 ml/100 l a partir da floração.

HORTÍCOLAS

- A partir da 2ª - 3ª semana após o transplante, aplicar à razão de 1 - 2 l/ha e aplicação através da fertirrega. Aplicar por via foliar à razão de 100 ml/100 l a partir da floração e repetir a aplicação conforme as necessidades da cultura.

OLIVAL

- Aplicar por via foliar a 100 ml/100 l em:
 - Abrolhamento primaveril;
 - Floração;
 - Azeitonas com tamanho de ervilha;
 - Tratamento outonal (opcional).

POMARES

- Aplicar em fertirrega à razão de 2 l/ha desde o estado de gomo inchado até ao vingamento dos primeiros frutos (2 - 3 aplicações). Uma vez produzida a floração, pulverizar à razão de 100 ml/100 l em 2 aplicações com 2 semanas de intervalo entre si.

OBSERVAÇÕES

Não misturar com cobre, óleos, ácidos minerais nem misturas sulfo-cálcicas. Para misturas com outros pesticidas, surfactantes ou fertilizantes, recomenda-se realizar um teste prévio de compatibilidade.

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 60 meses.

Utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não exceder as doses de aplicação recomendadas.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento ótima: 5 a 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.



H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P264 Lavar cuidadosamente após manuseamento.

P280 Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha selectiva em vigor.